

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам

протокол от «16» апреля 2022 № 120

Инструкция по применению препарата ветеринарного «Ихтиол 100»

1 Общие сведения

- 1.1 Ихтиол 100 (Ichthyolum 100).
- 1.2 Ихтиол 100 представляет собой густую или сиропообразную однородную жидкость темно-бурого цвета, с запахом ихтиола.
- 1.3 Лекарственная форма: жидкость для наружного, внутриматочного и внутреннего применения.
- 1.4 Состав: ихтиол ветеринарный, содержащий 12,0 % серы.
- 1.5 Препарат выпускают в полимерной таре по 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг; 0,8 кг; 1,0 кг; 5,0 кг.
- 1.6 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 25 °С.
- 1.7 Срок годности: 5 лет от даты изготовления.

2 Фармакологические свойства

- 2.1 Действует антимикробно и кератопластически. После нанесения на поврежденные поверхности и слизистые оболочки, помимо антимикробного влияния, ускоряет регенерацию тканей. Противовоспалительное действие заключается в регуляции сосудистого тонуса и восстановлении периферического кровообращения.
- 2.2 При приеме внутрь оказывает антисептическое и противобродильное действие.

3 Порядок применения

- 3.1 Назначают наружно животным при различных заболеваниях кожи (раны, экземы, ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии), подкожной клетчатки и мышц, при артритах, тендинитах, тендовагинитах, бурситах, мастите. При гнойных процессах используют в виде примочек 5 % концентрации, приготовленных на изотоническом растворе натрия хлорида, 1-2 раза в сутки до клинического выздоровления. При хронических асептических процессах используют в виде примочек 20 % концентрации, приготовленных на изотоническом растворе натрия хлорида, 1-2 раза в сутки в течение 3-5 суток.
- 3.2 В качестве антисептического и противобродильного средства применяют внутрь при острой тимпании рубца, метеоризме, функциональном расстройстве кишечника, воспалении желудка и кишечника, коликах. Дозы внутрь: лошадям 10-30 г; крупному рогатому скоту 10-20 г; мелкому рогатому скоту и свиньям 1-5 г, перед введением препарат развести в 0,5 л воды.
- 3.3 В акушерской практике используют при эндометрите внутриматочно, при вагините внутривагинально методом спринцевания в виде 3-5% растворов, приготовленных на изотоническом растворе натрия хлорида, из расчета 20 мл раствора на 100 кг живой массы с интервалом 48 часов до выздоровления.
- 3.4 Препарат несовместим в растворах с алкалоидами, солями тяжелых металлов, солями йода, аммиака, гликозидов.
- 3.5 После наружного применения препарата животноводческую продукцию используют без ограничений, а после внутреннего – через 5 суток после последнего применения препарата.

4 Меры профилактики

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций


- 5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 Полное наименование производителя

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов», 210001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15В.

Инструкция подготовлена сотрудниками УО ВГАВМ Руколем В.М., Гарбузовым А.А., Юшковским Е.А.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОВРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
26	2022 г. протокол № 120